

Diarsanyl[®]+



Kiegészítő takarmány különleges táplálkozási célokra. Diétás. Belsőleges paszta kutyá és macska részére.

Mieszanka paszowa uzupełniająca dietetyczna. Redukcja ostrych zaburzeń wchłaniania jelitowego.

Pasta doustna dla psów i kotów.

Dietetická pasta na redukcii akútnych střečných absorpčných problémů pro psy a kočky.

Dietetická pasta na redukcii akútnych črevných absorpčných problémov pre psy a mačky.

ÖSSZETÉTEL:

Frukto-oligoszacharidok, dextróz, glicerol, nátrium (klorid-só), magnézium (citromsav-só)

ADALÉKANYAGOK:

Technológiai adalékanyag: Bentonite-montmorillonite (E558) 40 %
Tartósítószer : Kálium-szorbát (E 202) 2%

ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK:

Nyersfehérje: 2,5%, Nyersrost: 2,5%, Nyersolajok- és zsírok: 0%, Nyershamu: 30%, Összes cukor : 46%, Nátrium: 2,5%, Kálium: 0,6%, Nedvesség : 22%

FELHASZNÁLÁSI CÉL: Akut bélrendszeri felszívódási (abszorpció) rendellenességek csökkentése. Akut hasmenés vagy abból való lábadozás idején.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ, ADAGOLÁS:


 Szájon át alkalmazandó.

A 10 ml-es injektor dugattyúján 10 osztás található, ahol egy osztás 1 ml-nyi pasztának felel meg. A 24 ml-es injektoron 12 osztás található, ahol egy osztás 2 ml-nyi pasztának felel meg. A dugattyún lévő gyűrű elforgatásával beállíthatja az egyszeri adagot. Helyezze az injektort az állat szájának a sarkába, úgy, hogy annak vége minél beljebb, az állat nyelvére támaszkodjon! Az adag akkor távozott, amikor a dugattyút megnyomását követően az injektor teste a gyűrűnek ütközik. Az alábbi táblázat segítségével kiszámolhatja kedvence napi adagját. Az adagolás javasolt átlagos időtartama 7-14 nap.

Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.

Kiszerezés	Az állat tömege	Adag (osztások száma)		Egy osztásnak megfelelő mennyiség (ml)
		Reggel	Este	
Diarsanyl [®] +10 ml	2 - 7 kg	1	1	1
Diarsanyl [®] +24 ml	8 - 18 kg	1	1	2
	19 - 30 kg	2	2	
	31 - 40 kg	3	3	
	41 - 50 kg	4	4	
	50 kg felett	5	5	

KISZERELÉS:



Egy 10 ml-es injektor, papírdobozban.
Egy 24 ml-es injektor, papírdobozban.

TÁROLÁS: Szobahőmérsékleten tárolandó! Gyermekek elől elzárva tartandó!
Tételszám (Lot): lásd a csomagoláson.

Minőségét megőrzi (Exp-hh/éééé): lásd a csomagoláson.

FORGALMAZÓ: CEVA-PHYLAXIA Zrt., 1107 Budapest, Szállás u. 5.,
Nyilvántartási szám: α HU 20 2 0023

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: A Diarsanyl[®] + pasztát kellemes íze és illata miatt a kutyák többsége szívesen elfogyasztja. Bármi legyen is a hasmenést kiváltó ok, a bélnyálkahártya felületét bevonó természetes mucinréteg minden esetben károsodik. A további károsodás elkerülésére a Diarsanyl[®] + pasztában lévő montmorillonit védőréteget képez az irritált bélnyálkahártya felületén, valamint segíti a természetes mucinréteg regenerálódását. A montmorillonit képes megkötni a szervezet számára káros anyagokat (toxínok, baktériumok, vírusok, stb.). A készítmény elektrolittartalma hozzájárul a hasmenéssel elvesztett létfontosságú ionok pótlásához. A dextróz könnyen, a szervezet külön megterhelése nélkül hasznosuló energiaforrásként szolgál. A frukto-oligo-szacharidok (FOS) ún. prebiotikumok, amelyek elősegítik a normál bélfloát alkotó baktériumok növekedését.

SKLAD:

4.1.14 Fruktooligosacharydy, 13.2.2 Dekstroza, 13.8.2 Glicerol, 11.4.1 Chlorek sodu, 11.2.10 Sole magnezowe kwasów organicznych

DODATKI:

Dodatki technologiczne: Spojwa, środki przeciwzbrylające i koagulanty: Bentonit - montmorillonit (E558) 40%

Konserwanty: Sorbinian potasu (E202) 2%

DEKLARACJA OBOWIĄZKOWA:


Składniki analityczne:

Białko surowe: 2,5%, Włókno surowe: 2,5%, Oleje i tłuszcze surowe: 0%, Popiół surowy: 30%, Węglowodany ogółem: 46%, Sód: 2,5%, Potas: 0,6%, Wilgotność: 22%

INSTRUKCJA STOSOWANIA: Podawać doustnie. Na tłoku tubo strzykawkki o pojemności 10 ml znajduje się 10 podziałek, każda odpowiada 1 ml pasty. Na tłoku tubo strzykawkki o pojemności 24 ml znajduje się 12 podziałek, każda odpowiada 2 ml pasty. Odpowiednią dawkę odmierza się przekręcając pierścień umieszczony na tłoku. Podczas podawania pasty należy umieścić konus tubo strzykawkki w kącie pyska zwierzęcia tak, aby końcówka dotykała trzonu języka. Odmierzoną dawkę podaje się naciskając na tłok do momentu, aż pierścień dotknie pojemnika tubo strzykawkki. Dzienną dawkę preparatu dla zwierzęcia należy obliczyć zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej. Zalecany czas stosowania produktu wynosi 7-14 dni.

Wielkość opakowania	Waga zwierzęcia	Dawka (ilość podziałek)		Ilość preparatu odpowiadająca jednej podziałce (ml)
		Rano	Wieczorem	
Diarsanyl [®] +10 ml	2 - 7 kg	1	1	1
Diarsanyl [®] +24 ml	8 - 18 kg	1	1	2
	19 - 30 kg	2	2	
	31 - 40 kg	3	3	
	41 - 50 kg	4	4	
	Powyżej 50 kg	5	5	

OPAKOWANIE:



Kartonowe pudełko, zawierające tubo strzykawkę o pojemności 10 ml.
Kartonowe pudełko, zawierające tubo strzykawkę o pojemności 24 ml.

PRZECHOWYWANIE:

 Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

DODATKOWE INFORMACJE: Diarsanyl[®] PLUS pasta jest chętnie przyjmowana przez większość psów ze względu na przyjemny zapach i smak. Niezależnie od tła biegunki, dochodzi do zmian w naturalnej warstwie mucynowej powlekającej śluzówkę jelita. Bentonit - montmorillonit zawarty w produkcie tworzy na podrażnionej śluzówce jelit warstwę ochronną oraz pomaga w odtworzeniu naturalnej warstwy śluzu. Bentonit - montmorillonit wiąże szkodliwe czynniki (toksyny, bakterie, wirusy, itp.), uniemożliwiając ich wchłanianie i wyrządzenie przez nie szkód w organizmie. Obecne w preparacie elektrolity biorą udział w zastępowaniu niezbędnych jonów utraconych podczas biegunki. Dekstroza pełni funkcję łatwo przyswajalnego źródła energii, nie obciążając organizmu. Fruktooligosacharydy (FOS) zwane też prebiotykami, stymulują rozwój flory bakteryjnej jelit.

PRODUCENT: α FR 36 035 007

DYSTRYBUTOR: Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o., ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, α PL I 465050p

„Najlepiej wykorzystać przed:” = EXP, „Nr referencyjny partii:” = Lot - dane umieszczone bezpośrednio na pudełku i tubostrzykawce.

Pasta pro psy a kočky pro perorální použití.

Složení:

Fruktooligosacharidy, Dextróza,
Glycerol, Chlorid sodný,
Organické soli horčíka

Přídavné látky:

Bentonite - montmorillonite (E558) 40 %
Sorban draselný 2%


Analytické složky:

Surové bílkoviny: 2,5%, Surová vláknina: 2,5%, Oleje a tuky: 0%, Surový popel: 30%, Sacharidy: 46%, Sodík: 2,5%, Draslík: 0,6%, Vlhkost: 22%

POUŽITÍ: Diarsanyl® PLUS pastu je doporučeno podávat v průběhu akutního průjmu a v průběhu zotavování se z akutního průjmu. Před použitím se poraďte s veterinárním lékařem.

DÁVKOVÁNÍ: Perorální podávání. 10 ml stříkačka je rozdělena na 10 dílků, každý dílek zodpovídá 1 ml pasty. 24 ml stříkačka je rozdělena na 12 dílků, každý dílek zodpovídá 2 ml pasty. Potřebnou dávku nastavíte otáčením kroužku na pístu stříkačky. Vložte stříkačku do rohu papule zvířete, tak aby konec stříkačky byl co nejbližší při kořenu jazyka! Množstvo pasty odpovídající jednomu dílku je vytlačené v případě když kroužek po stlačení pístu narazí na tělo stříkačky. S pomocí níže uvedené tabulky lehko určíte potřebnou dávku. Doporučovaná délka podávání je 7 – 14 dnů. Před použitím se poraďte s veterinárním lékařem!

Velikost balení	Váha zvířete	Dávka (počet dílků)		Množstvo odpovídající 1 dílku (ml)
		Ráno	Večer	
Diarsanyl® +10 ml	2 - 7 kg	1	1	1
Diarsanyl® +24 ml	8 - 18 kg	1	1	2
	19 - 30 kg	2	2	
	31 - 40 kg	3	3	
	41 - 50 kg	4	4	
	nad 50 kg	5	5	

VELIKOST BALENÍ:

10 ml plastová stříkačka v papírové skládáče.
24 ml plastová stříkačka v papírové skládáče.

ZPŮSOB UCHOVÁVÁNÍ: Při pokojové teplotě! Skladujte mimo dosah dětí!

DISTRIBUTOR: Ceva Animal Health Slovakia spol. s ro., Račianska 77, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

DALŠÍ INFORMACE: Diarsanyl® + pasta má příjemnou vůni i chuť, proto ji většina zvířat přijímá dobrovolně. V důsledku průjmu je poškozená přirozená mucinová ochranná vrstva střeva.

Diarsanyl® + pasta zabraňuje dalšímu poškození podrážděné střevní sliznice tím, že na ní vytváří ochrannou vrstvu a zároveň tak napomáhá regeneraci přirozené mukózní vrstvy. Montmorillonit absorbuje škodlivé prvky (toxiny, bakterie, viry), čím zabraňuje jejich vstřebání a škodlivému působení na organismus. Obsah elektrolytů v přípravku pomáhá nahrazovat ztráty iontů, vzniknuté během průjmu. Dextroza představuje snadno dostupný zdroj energie bez zatěžování organismu. Fruktooligosacharidy (FOS) tzv. prebiotika napomáhají obnovit přirozenou střevní mikroflóru.

POUZE PRO ZVÍŘATA

Pasta pro psy a kočky pro perorální použití.

Složení:

Fruktooligosacharidy, Dextróza,
Glycerol, Chlorid sodný, Organické soli horčíka

Přídavné látky:

Bentonite - montmorillonite (E558) 40 %
Sorban draselný 2%

Analytické složky:


Surové bílkoviny: 2,5%, Surová vláknina: 2,5%, Oleje a tuky: 0%, Surový popel: 30%, Sacharidy: 46%, Sodík: 2,5%, Draslík: 0,6%, Vlhkost: 22%

Použití:

Diarsanyl® PLUS pastu je doporučeno podávat v průběhu akutních hnaček nebo v průběhu zotavování se z akutních hnaček. Před použitím se poraďte s veterinárním lékařem.

DÁVKOVÁNÍ: Pre perorální použití. 10 ml stříkačka je rozdělena na 10 dílků, každý dílek zodpovídá 1 ml pasty. 24 ml stříkačka je rozdělena na 12 dílků, každý dílek zodpovídá 2 ml pasty. Potřebnou dávku nastavíte otáčením kroužku na píste stříkačky. Vložte stříkačku do rohu papule zvířete tak, aby konec stříkačky byl co nejbližší při kořenu jazyka! Množstvo pasty zodpovídající jednomu dílku je vytlačeno v případě ak kroužok po stlačení pístu narazí na tělo stříkačky. Pomocou nižšie uvedenej tabuľky ľahko určíte potrebnú dávku. Odporúčaná dĺžka podávania je 7 – 14 dní. Pred použitím sa poraďte s veterinárnym lekárom!

Velkost balenia	Váha zvieratá	Dávka (Počet dielikov)		Množstvo zodpovedajúce 1 dielik (ml)
		Ráno	Večer	
Diarsanyl® +10 ml	2 - 7 kg	1	1	1
Diarsanyl® +24 ml	8 - 18 kg	1	1	2
	19 - 30 kg	2	2	
	31 - 40 kg	3	3	
	41 - 50 kg	4	4	
	nad 50 kg	5	5	

VELKOST BALENIA:

10 ml plastová striekačka v papierovej krabičke.
24 ml plastová striekačka v papierovej krabičke.

SPŮSOB UCHOVÁVANIA: Pri izbovej teplote! Skladovať mimo dosahu detí!

DISTRIBÚTOR: Ceva Animal Health Slovakia spol. s ro., Račianska 77, 831 02 Bratislava, Slovenská republika

ĎALŠIE INFORMÁCIE: Diarsanyl® PLUS pasta je vďaka jej príjemnej vôni a chuti dobrovoľne prijímaná väčšinou psov. Akákoľvek je príčina hnačky, prirodzená mucinová vrstva črevnej sliznice je poškodená. Za účelom zabránenia ďalšieho poškodenia sliznice, montmorillonit obsiahnutý v prípravku vytvára ochrannú vrstvu na povrchu poškodenej sliznice a takisto pomáha pri regenerácii prirodzenej mucinovej vrstvy. Montmorillonit absorbuje toxíny, baktérie, vírusy a iné škodlivé molekuly, takže tieto nemôžu byť ďalej absorbované a škodiť v organizme. Elektrolyty obsiahnuté v prípravku nahrádzajú esenciálne elektrolyty, ktoré sa vyčerpali v dôsledku hnačky. Dextróza predstavuje ľahko dostupný externý zdroj energie bez odčerpávania energie organizmu. Fruktooligosacharidy (FOS) tzv. probiotiká napomáhajú obnovu prirodzenej črevnej mikroflóry.

LEN PRE ZVIERATÁ

DIARSANYL PLUS Black
HU-PL-CZ-SK
NOTICE
CODE ARTICLE : 54671-02
FORMAT/TYPE : 300x148
CORPS : 8

LOUIS 04/12/13 - 09/12/13 - 20/12/13 - 10/01/14 - 20/01/14